



**Trival**<sup>®</sup> 

**Metronidazol / Miconazol Nitrato  
Neomicina Sulfato / Centella Asiática  
Polimixina B Sulfato**

**VIA VAGINAL**

**Crema**

**FORMULA**

Cada 5.5 gramos contienen:

<i>Metronidazol</i> .....	0.400 g
<i>Miconazol Nitrato</i> .....	0.100 g
<i>Neomicina Sulfato</i> .....	0.045 g
<i>Centella Asiática</i> .....	0.015 g
<i>Polimixina B Sulfato</i> .....	0.005 g
Excipientes.....	C.S.

**ACCION TERAPEUTICA**

TRIVAL Crema es una asociación destinada al tratamiento de las infecciones vaginales.

**INDICACIONES**

Tratamiento local de las micosis vulvo-vaginales, vaginitis por tricomonas y vaginitis inespecíficas en las que se presume sobre infección con gérmenes sensibles a la Neomicina y la Polimixina.

**ACCION FARMACOLOGICA**

Por su composición TRIVAL Crema tiene actividad sobre protozoarios como la Tricomona vaginalis, sobre bacterias como la Gardnerella vaginalis, Micoplasma Hominis, gérmenes Gram positivos y Gram negativos, y sobre hongos, especialmente del género Cándida.

También posee efectos tróficos que favorecen la recuperación del epitelio vaginal.

**FARMACOCINETICA**

Luego de la administración por vía vaginal la absorción de los principios activos es insignificante por lo que los niveles plasmáticos son muy bajos y no producen efectos sistémicos de importancia clínica.

**POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION**

Introducir un aplicador vía vaginal profundo, por la noche al acostarse, durante 6 a 12 días.

**CONTRAINDICACIONES**

No administrar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación, principalmente alguno que haya tenido reacciones a los imidazoles. Si bien la absorción por esta vía no es significativa, no se aconseja su administración durante el primer trimestre del embarazo.

**ADVERTENCIAS**

Es conveniente evitar la ingestión de bebidas alcohólicas durante el tratamiento. La administración de este medicamento no protege del contagio de enfermedades de transmisión sexual.

**PRECAUCIONES**

Administrar con precaución en pacientes con enfermedades activas del sistema nervioso central, con enfermedades hematológicas o con insuficiencia hepática grave.

Embarazo: No debe administrarse durante el primer trimestre, posteriormente el médico deberá evaluar los beneficios y riesgos potenciales de su empleo.

Lactancia: Si bien la absorción es muy baja, su administración queda a criterio del médico.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

El uso concurrente con anticoagulantes orales como la warfarina o los dicumarínicos puede provocar aumento del tiempo de protrombina y tendencia al sangrado. El consumo de alcohol durante el tratamiento puede ocasionar vómitos, sudoración e hipotensión.

**REACCIONES ADVERSAS**

Las reacciones adversas son de tipo local: Sensación de ardor o de irritación, prurito.

**SOBREDOSIFICACION**

Dado el grado de absorción que de manera tópica tienen los componentes de TRIVAL, resulta difícil la aparición de efectos sistémicos causados por los mismos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o llamar a su médico.

**PRESENTACION**

TRIVAL Crema: Tubo conteniendo 50 gramos de crema.

**PRODUCTO MEDICINAL.**

**REQUIERE RECETA MEDICA.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.**

**PROTEGER DE LA LUZ.**

 **1-809-200-1282**

**La Línea para el Cuidado de la mujer**

Fabricado por:

**Laboratorios Rowe, S.R.L.**

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Ultima revisión de texto noviembre, 2011



03799-2  
M211001





# Trival<sup>®</sup>

**METRONIDAZOL / MICONAZOL /  
CENTELLA ASIÁTICA /  
POLIMIXINA / NEOMICINA**

**Rowe<sup>fem</sup>**

FORMA FARMACÉUTICA

*cápsula blanda vaginal*

#### COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada cápsula blanda vaginal contiene **Metronidazol** 400 mg; Nitrato de **Miconazol** 100 mg; **Centella Asiática** 15 mg; Sulfato de **Polimixina** 5 mg; **Neomicina** 45 mg. Excipientes: Vaselina líquida; Vaselina sólida.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA

**TRIVAL** es una asociación destinada al tratamiento de las infecciones vaginales.

#### INDICACIONES

Tratamiento local de las micosis vulvo-vaginales, Vaginitis por tricomonas y vaginitis inespecíficas en las que se presume sobre infección con gérmenes sensibles a la Neomicina y la Polimixina.

#### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Por su composición **TRIVAL** tiene actividad antimicótica, antibacteriana y antitricomoniásica. También posee efectos tróficos que favorecen la recuperación del epitelio vaginal.

#### Microbiología

Por su composición **TRIVAL** tiene actividad sobre protozoarios como tricomonas, sobre bacterias como las *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma Hominis*, gérmenes Gram positivos y Gram negativos, y sobre hongos, especialmente del género *Candida*.

#### Farmacocinética

Luego de la administración por vía vaginal, la absorción es insignificante por lo que los niveles plasmáticos son muy bajos.

#### POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

**Adultos:** Una cápsula colocada por vía vaginal profunda, por la noche al acostarse, durante 6 a 12 días.

#### CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. Si bien la absorción por esta vía no es significativa, no se aconseja su administración durante el primer trimestre del embarazo.

#### ADVERTENCIAS

Es conveniente evitar la ingestión de bebidas alcohólicas durante el tratamiento. La administración de este medicamento no protege del contagio de enfermedades de transmisión sexual.

#### PRECAUCIONES

Administrar con precaución en pacientes con enfermedades activas del sistema nervioso central, con enfermedades hematológicas o con insuficiencia hepática grave.

**Embarazo:** No debe administrarse durante el primer trimestre, posteriormente el médico deberá evaluar los beneficios y riesgos potenciales de su empleo.

**Lactancia:** Si bien la absorción es muy baja, su administración queda a criterio del médico.

#### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso concurrente con anticoagulantes orales como la warfarina o los dicumarínicos puede provocar aumento del tiempo de protrombina y tendencia al sangrado. El consumo de alcohol durante el tratamiento puede ocasionar vómitos, sudoración, hipotensión (efecto antabus).

#### REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas son de tipo local: Sensación de ardor o de irritación, prurito.

#### SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o llamar a su médico.

#### PRESENTACION

**TRIVAL** cápsulas blandas vaginales: Cápsulas blandas ovales, color rosado. Envase conteniendo 6 y 12 cápsulas vaginales.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 25°C.**

**VARIACIÓN ADMITIDA ENTRE 15 Y 30°C.**

Fabricado por:

**Investi Farma S.A.**

Lisandro de la Torre 2160, C1440ECW.

Buenos Aires, Argentina.

Para: **LABORATORIOS ROWE, S.R.L.**

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Última revisión de texto enero, 2013

