



# COROPRES® AH

## CANDESARTAN CILEXETILO / AMLODIPINO / HIDROCLOROTIAZIDA

Comprimidos  
VIA ORAL

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

### FORMULAS

#### COROPRES AH 16/5/12.5

Cada comprimido contiene:

<b>Candesartán cilexetilo</b> .....	16 mg
<b>Amlopidino</b> (como Besilato).....	5 mg
<b>Hidroclorotiazida</b> .....	12.5 mg
Excipientes.....	c.s.

#### COROPRES AH 32/5/12.5

Cada comprimido contiene:

<b>Candesartán cilexetilo</b> .....	32 mg
<b>Amlopidino</b> (como Besilato).....	5 mg
<b>Hidroclorotiazida</b> .....	12.5 mg
Excipientes.....	c.s.

**¿QUÉ ES COROPRES AH Y PARA QUÉ SE UTILIZA?**  
**COROPRES AH** es una novedosa asociación de tres principios activos utilizados universalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial. **COROPRES AH** asocia amlopidino, un antagonista de los canales lentos del calcio, candesartán, un antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA II) e hidroclorotiazida, un diurético tiazídico. El amlopidino relaja el músculo de las arterias y del corazón lo que disminuye la presión arterial por aumento del diámetro de las arterias. El candesartán bloquea la acción de una hormona llamada angiotensina II evitando el aumento de la retención de agua y sodio a nivel del riñón y el aumento de la presión arterial. A su vez la hidroclorotiazida aumenta la eliminación de agua y sodio por la orina lo que disminuye la presión arterial. La combinación de los tres efectos lleva a una mayor disminución de la presión arterial, mientras que la presentación en un comprimido a utilizar solo una vez al día lleva a una mayor comodidad para el paciente.

### NO TOMES ESTE MEDICAMENTO:

- Si es alérgico (hipersensible) al amlopidino y dihidropiridinas, el candesartán y los ARA II, o la hidroclorotiazida y la sulfonamidas.
- Si está embarazada o piensa que puede estarlo.
- Si no puede orinar.
- En niños.

### TENGA PRECAUCIÓN SI:

- Se encuentra en una situación que lo pueda llevar a la deshidratación como diarrea intensa o vómitos.
- Presenta alteraciones graves en la función del hígado (cirrosis, hepatitis, obstrucción).
- Su médico le dijo que tiene obstrucción de una arteria importante llamada aorta, de las arterias de su corazón llamadas coronarias o de las arterias de sus riñones.
- Ha presentado episodios de una reacción llamada angioedema.
- Es diabético.
- Ha tenido alto el potasio en sangre recientemente.
- Tiene alguna enfermedad de las glándulas paratiroides.
- Si es el caso de tratamiento concomitante con glucocorticoides o litio.

### USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Ciertos medicamentos como el telaprevir (utilizado en el tratamiento de la hepatitis C) y el atazanavir (utilizado para el tratamiento de la infección por HIV) pueden aumentar el efecto de la asociación de amlopidino/candesartán/hidroclorotiazida y generar un excesivo descenso de la presión arterial así como la aparición de efectos adversos.

Otros medicamentos pueden ver aumentada su acción y el riesgo de efectos adversos si se toman durante el tratamiento con la asociación de amlopidino/hidroclorotiazida/candesartán, especialmente la simvastatina (utilizada para el tratamiento del colesterol alto en sangre), la domperidona (utilizado en trastornos de la digestión), la digoxina (utilizado en enfermedades del corazón), el metotrexate y la ciclofosfamida (utilizados en enfermedades del sistema inmune, inflamatorias y quimioterapia del cáncer), el sotalol (utilizado en enfermedades del corazón) y el litio (utilizado en patologías psiquiátricas).

El dopedogrel (utilizado en trastornos de la coagulación) puede ver reducida su eficacia si se utiliza durante el tratamiento con la asociación de amlopidino/hidroclorotiazida/candesartán.

Ciertos medicamentos que se utilizan en enfermedades del corazón pueden generar alteraciones del ritmo cardiaco si se utilizan durante el tratamiento con la asociación de amlopidino/hidroclorotiazida/candesartán como pueden ser el droperidol, la flecainida y amiodarona.

El uso de aliskiren (un medicamento utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial) concomitantemente con candesartán puede llevar un aumento excesivo del potasio en sangre por lo que se recomienda evitar esta asociación.

**Toma de COROPRES AH con los alimentos y bebidas**  
**COROPRES AH** puede ser tomado con o sin alimentos.

**Embarazo y lactancia**  
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. No tome este medicamento si está embarazada o piensa que puede estarlo. No se recomienda la utilización de este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

**Conducción y uso de máquinas**  
No conduzca y no maneje herramientas o máquinas peligrosas debido a que durante el tratamiento con este medicamento pueden producirse mareos.

### CÓMO TOMAR COROPRES AH

Siga exactamente las instrucciones de administración de **COROPRES AH** indicadas por su médico. La dosis habitual es de un comprimido de **COROPRES AH 16/5/12.5 mg** una vez al día.

La dosis de mantenimiento de Coropres AH puede ser incrementada según la necesidad de cada caso, luego de dos semanas, a un comprimido de **COROPRES AH 32/5/12.5 mg** hasta la máxima dosis de Candesartán 32 mg; Amlopidino 10 mg e Hidroclorotiazida 12.5 mg.

**Uso en niños**  
Este medicamento no está recomendado para su uso en niños.

**Uso en poblaciones especiales**  
Debe utilizarse con precaución en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

**SI TOMA MÁS COROPRES AH DEL QUE DEBIERA**  
En caso de sobredosis consulte inmediatamente a la emergencia médica y al centro toxicológico de referencia de su zona. Si es posible consulte a la emergencia médica con el envase o el prospecto del producto ingerido.

En caso de intoxicación puede observarse aumento del azúcar en sangre, mucosas secas, sed y aumento de la cantidad de orina emitida, disminución de la presión arterial, ritmo cardíaco rápido, dolor de cabeza, mareos, fatiga, cansancio, calambres y espasmos musculares, convulsiones y pérdida de conocimiento.

En caso de intoxicación debe consultar inmediatamente a la emergencia médica y en caso de mareos o convulsiones colocar al paciente tumbado sobre la espalda, con la piernas algo elevadas y la cabeza hacia uno de los lados del rostro (lateralizada).

En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica mas cercana o llame al centro de Toxicología de referencia.

#### **SI OLVIDÓ TOMAR COROPRES AH**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **SI INTERRUMPE EL TRATAMIENTO CON COROPRES AH**

Tome la dosis olvidada lo antes posible, si ya está próxima la hora de la siguiente dosis salte la dosis olvidada. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, COROPRES AH puede producir efectos no deseados.

El efecto adverso más frecuentemente descrito son las piernas hinchadas. Con menor frecuencia se ha descrito: diarrea, dolor abdominal, náuseas, mareos, somnolencia, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz y disminución de la presión arterial. Excepcionalmente se ha reportado: erupciones en piel, piel enrojecida e inflamada, hinchazón en la cara, labios y garganta, angina de pecho, infarto, alteraciones en el ritmo cardíaco, aumento del azúcar en sangre, dolor abdominal intenso, color amarillo de piel y mucosas, materias fecales decoloridas, disminución de la visión transitoria e insuficiencia renal.

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

#### **CONSERVACION**

Mantener a temperatura inferior a 30 °C.

#### **PRESENTACION**

**COROPRES AH 16/5/12.5:** Caja conteniendo 30 comprimidos.

**COROPRES AH 32/5/12.5:** Caja conteniendo 30 comprimidos.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

PRODUCTO MEDICINAL  
EXPENDIO BAJO RECETA MEDICA.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS.

PRODUCTO ELABORADO POR  
LABORATORIOS ROWE, S.R.L.  
STO. DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.