



ECARDIL® D

LISINOPRIL HIDROCLOROTIAZIDA

VIA ORAL

Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FORMULAS

ECARDIL D 10/12.5

Cada comprimido contiene: Lisinopril dihidrato 10.89 mg (equivalente a Lisinopril 10 mg) Hidroclorotiazida 12.5 mg; Excipientes c.s.

ECARDIL D 10/25

Cada comprimido contiene: Lisinopril dihidrato 10.89 mg (equivalente a Lisinopril 10 mg) Hidroclorotiazida 25 mg; Excipientes c.s.

ECARDIL D 20/12.5

Cada comprimido contiene: Lisinopril dihidrato 21.78 mg (equivalente a Lisinopril 20 mg) Hidroclorotiazida 12.5 mg; Excipientes c.s.

¿QUE ES ECARDIL D Y PARA QUE SE UTILIZA?

ECARDIL D es una asociación a dosis fija de dos fármacos utilizados a nivel mundial para el tratamiento de la hipertensión arterial: el lisinopril y la hidroclorotiazida. El lisinopril es un fármaco del grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) que disminuye la formación de una sustancia que aumenta la presión arterial.

La hidroclorotiazida es un diurético del grupo de las tiazidas que aumenta la eliminación de agua y sales por lo que disminuye la presión arterial. Se ha demostrado que la disminución de la presión arterial producida por estos fármacos disminuye el riesgo de ataque cerebral o del corazón.

ECARDIL D está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial en aquellos pacientes que no logran controlar sus cifras de presión arterial siguiendo una correcta dieta, plan de ejercicios y la utilización de un medicamento.

NO TOMES ESTE MEDICAMENTO SI:

- Es alérgico (hipersensible) a los principios activos de este medicamento así como a los fármacos llamados sulfonamidas.
- Ha tenido usted o algún familiar directo una enfermedad llamada angioedema como resultado del uso de a los fármacos llamados sulfonamidas. llamados IECA (como por ej.: captopril, enalapril, ramipril, perindopril) caracterizada fundamentalmente por hinchazón a nivel de la cara, labios, cuello, cabeza, manos y nalgas, así como falta de aire.
- No puede orinar.

TENGA PRECAUCIÓN SI:

- Está embarazada o piensa que puede estarlo.
- Presenta durante el tratamiento con este medicamento sangrados fáciles, hematomas, manchas rojas en la piel o palidez consulte inmediatamente a su médico.
- Va a ser operado informe a su médico que está tomando este medicamento.
- Presenta dolor en forma de retortijones intensos en el abdomen, diarrea o no puede movilizar ni expulsar gases por el intestino consulte a la emergencia médica inmediatamente.
- Un sonido ronco al respirar con dificultad, consulte inmediatamente a la emergencia médica.
- Nota que ve menos que habitualmente y que esa disminución de la visión aparece rápidamente, suspenda el tratamiento con este medicamento y consulte a su médico inmediatamente.
- Tiene obstrucción (estenosis) en la arteria aorta o presenta alguna enfermedad del corazón llamada cardiopatía obstructiva.
- Le van a realizar un procedimiento, para disminuirle el colesterol en sangre, llamado aféresis, a través de un proceso donde su sangre es filtrada por un equipo, informe a su médico que está tomando este medicamento, ya que se han producido reacciones alérgicas. Similar situación se ha producido durante la hemodiálisis por lo que también debe informar a su médico antes de dicho procedimiento.
- Es afrodescendiente ya que aumenta el riesgo de angioedema.
- Tiene alguna enfermedad por obstrucción en los vasos del cerebro, debido a que se incrementa el riesgo de disminución excesiva de la presión arterial.
- Padece cirrosis o insuficiencia hepática.
- Utiliza este medicamento con otros medicamentos como los antagonistas del receptor de angiotensina II (por ej.: valsartán, losartán y telmisartán).
- Utiliza este medicamento durante el tratamiento con aliskiren.
- Va a recibir tratamiento con veneno de himenoptera para algún tipo de alergia.
- Recibe tratamiento con litio.
- Padece insuficiencia cardíaca o renal.
- Se observa color amarillento en la piel o las mucosas, suspenda el tratamiento con este medicamento y consulte al médico inmediatamente.
- Es diabético.
- Padece de gota o tiene alto el ácido úrico en sangre.
- Ha tenido el potasio alto en sangre.
- Tiene obstrucción de las arterias de su corazón llamadas coronarias o de las arterias de los riñones.
- Padece lupus eritematoso sistémico.
- Ha presentado vómitos intensos, ha orinado mucho o no ha tomado suficiente líquido.

USO CON OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica. Debe evitar asociar con lisinopril/ hidroclorotiazida medicamentos para la hipertensión arterial que contienen : aliskiren, ketanserina, valsartán, losartán y telmisartán. Tampoco deben asociarse diuréticos (que aumentan la capacidad de orinar) como el amiloride, el triamtreno y la espirolactona o suplementos que contengan potasio, así como tampoco diuréticos que puedan disminuir el potasio como el furosemda.

Ciertos medicamentos utilizados en enfermedades inflamatorias, trasplante de órganos o quimioterapia deben como el furosemda.

Ciertos medicamentos utilizados en enfermedades inflamatorias, trasplante de órganos o quimioterapia deben evitarse como: el metrotexate, la azatriopina y la ciclofosfamida. Debe evitarse la utilización de este medicamento durante el tratamiento con litio. Algunos medicamentos utilizados para enfermedades del corazón como: el sotalol, droperidol, levometadil, trióxido de arsénico, digoxina o flecainamida no deben utilizarse durante el tratamiento con lisinopril o hidroclorotiazida.

TOMA DE ECARDIL D CON LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECARDIL D

Puede ser tomado con o sin alimentos.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. Si está embarazada o piensa que puede estarlo no tome este medicamento. No debe utilizar este medicamento durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa ya que este medicamento puede causarle mareos.

¿COMO TOMAR ECARDIL D?

Siga exactamente las instrucciones de administración de **ECARDIL D** indicadas por su médico. Aquel paciente cuya presión arterial no se controla adecuadamente, ya sea con lisinopril o hidroclorotiazida usados en monoterapia puede ser cambiado a un comprimido de **ECARDIL D 10/12.5 mg** por día, un comprimido de **ECARDIL D 20/12.5 mg** por día o un comprimido de **ECARDIL D 10/25 mg** por día, dependiendo de la dosis monoterapia que actualmente viene utilizando. Incrementos adicionales de uno o ambos componentes deben depender de la respuesta clínica con la presión arterial medida en el intervalo de interdosis para asegurar que hay un efecto antihipertensivo adecuado en ese momento. La dosis generalmente no debe aumentarse hasta que hayan transcurrido 2-3 semanas.

Uso en niños

ECARDIL D no debe ser utilizado en menores de 18 años.

Uso en poblaciones especiales.

No deben realizarse ajustes en la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada, en caso de insuficiencia renal severa no debe utilizarse este medicamento. En caso de insuficiencia hepática y ancianos debe tenerse precaución.

SI TOMA MÁS ECARDIL D DEL QUE DEBIERA

En caso de sobredosis consulte inmediatamente a la emergencia médica y al centro toxicológico de referencia de su zona. Al momento de la consulta es recomendable que tenga con usted el envase del medicamento o este prospecto. En caso de intoxicación puede observarse disminución de la presión arterial, mareos, pérdida de conocimiento, ritmo del corazón lento o acelerado, piel y mucosas secas, dolor de cabeza, calambres en los músculos, sed intensa, excesiva cantidad de orina, convulsiones e incluso estado de coma. Las maniobras fundamentales incluyen recostar al paciente

sobre la espalda con el rostro apoyado por uno de sus lados en el suelo y colocar las piernas elevadas por encima del tronco hasta que el paciente reciba atención médica. Debe consultarse inmediatamente a la emergencia médica.

SI OLVIDO TOMAR ECARDIL D

Tome la dosis olvidada lo antes posible, si ya es la hora de la próxima dosis salte la dosis olvidada. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

SI INTERRUMPE EL TRATAMIENTO CON ECARDIL D

Puede que no consiga el control deseado de su presión arterial y sufra alguna complicación de las cifras elevadas de la presión arterial. Consulte a su médico antes de realizar cualquier cambio en la forma de tomar su medicación.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS.

Al igual que todos los medicamentos, **ECARDIL D** puede producir efectos no deseados. Se han descrito la presencia de: mareos, dolor de cabeza, tos, disminución de la presión arterial, cansancio y calambres. Poco frecuentemente se ha referido: dolor en el abdomen tipo retortijón y dolor intenso, diarrea, no poder expulsar materias fecales o gases, color amarillo de piel y mucosas, disminución rápida de la visión e hinchazón de la cara, el cuello, los labios, las manos y los pies o la ingle. No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

CONSERVACION

Mantener a temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIONES

ECARDIL D 10/12.5

Caja que contiene 30 comprimidos.

ECARDIL D 10/25

Caja que contiene 30 o 100 comprimidos

ECARDIL D 20/12.5

Caja que contiene 30 comprimidos.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro. Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación, llamar al centro médico de referencia de su zona.

PRODUCTO MEDICINAL
EXPENDIO BAJO RECETA MEDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.

PRODUCTO ELABORADO POR
LABORATORIOS ROWE, S.R.L.
STO. DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.