



# TEBOKAN<sup>®</sup>

# TEBOKAN<sup>®</sup> FORTE

## Extracto de Ginkgo biloba VIA ORAL

Comprimidos recubiertos / Solución gotas

### FORMULAS

#### TEBOKAN comprimidos recubiertos

Cada comprimido recubierto contiene:

Extracto de *Ginkgo biloba*.....40 mg  
Excipientes.....c.s.

#### TEBOKAN FORTE

Cada comprimido recubierto contiene:

Extracto de *Ginkgo biloba*.....80 mg  
Excipientes.....c.s.

#### TEBOKAN solución gotas

Cada mL contiene:

Extracto de *Ginkgo biloba*.....40 mg  
Excipientes.....c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado TEBOKAN y TEBOKAN FORTE para obtener los mejores resultados. Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita información adicional o consejo, consulte a su médico. Si los síntomas empeoran, persisten o no nota efecto después de 10 días, consulte a su médico. Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

#### ¿QUÉ ES TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

TEBOKAN y TEBOKAN FORTE es extracto en polvo de Ginkgo biloba, que ejerce una acción polivalente mejorando la microcirculación y las propiedades reológicas sanguíneas, porque disminuye su viscosidad, aumenta la flexibilidad de los eritrocitos, inhibe la agregación plaquetaria, produce vasodilatación central y periférica, aumentando la velocidad de flujo sanguíneo. El Extracto en polvo de Ginkgo biloba aumenta la tolerancia a la hipoxia, protege el metabolismo energético cerebral citotóxico; favorece la recaptación de acetilcolina en el hipocampo y aumenta el número de receptores muscarínicos y alfa 2 adrenérgicos, evita la peroxidación patológica de lípidos ya que neutraliza los radicales tóxicos de oxígeno por acción de los flavonoides y antagoniza al factor activador plaquetario (PAF). Por acción de los ginkgólidos, tiene propiedades neuroprotectoras.

TEBOKAN y TEBOKAN FORTE está indicado para el alivio sintomático en la microcirculación cerebral (como vértigos y tinnitus) o de los síntomas asociados a insuficiencia circulatoria en las extremidades (calambres y sensación de frío en las piernas).

Tiene influencia sobre los trastornos de la memoria y el aprendizaje, déficit funcional cerebral con rendimiento intelectual y vigilancia disminuidos.

#### ANTES DE TOMAR TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE

No tome este medicamento:

Si es usted alérgico a algunos de los componentes de TEBOKAN y TEBOKAN FORTE.

No administrar en caso de embarazo.

#### TENGA PRECAUCIÓN CON TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE

Si los síntomas empeoran o persisten después de este periodo de tiempo, a pesar de la toma regular y dosis suficiente, se debe consultar con el médico, indicándole la dosis y el tiempo que ha tomado este medicamento.

En el tratamiento del vértigo la administración durante más de 8 semanas no aporta beneficio terapéutico. En caso de tinnitus, si no se observa mejoría en las 6-8 primeras semanas de tratamiento, no se recomienda continuar con el mismo, ya que no se espera mejoría.

En caso de tendencia aumentada al sangrado (diátesis hemorrágica) y del tratamiento simultáneo con medicamentos anti-coagulantes, este medicamento sólo debería ser tomado después de consultar con el médico.

Se aconseja evitar el uso del extracto de Ginkgo biloba por parte de los pacientes con antecedentes de convulsiones o que están tomando medicamentos que disminuyan el umbral convulsivo. Se debe considerar la posibilidad de suspender el extracto de Ginkgo biloba antes de la cirugía electiva, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado postoperatorio.

#### Uso en niños:

No se dispone de suficiente experiencia clínica en este grupo de edad.

No está recomendado para su uso en adolescentes menores de 18 años de edad porque no tiene indicaciones adecuadas para ellos, además no se han realizado estudios demostrativos de seguridad y eficacia en estos grupos de edad.

#### Embarazo

No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que no se recomienda su uso sin prescripción médica.

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de usar este medicamento.



## Lactancia

No existe información del paso de los componentes del extracto a la leche materna. Se recomienda que consulte a su médico antes de tomar este medicamento durante la lactancia.

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

### USO DE TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE CON OTROS MEDICAMENTOS

El Ginkgo biloba puede aumentar la acción de los antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y heparinas (como fenprocoumon, warfarina, clopidogrel, ácido acetilsalicílico y otros antireumáticos no esteroideos), por lo que si usted está en tratamiento con algún medicamento de este tipo, consulte a su médico.

El uso de Ginkgo biloba puede disminuir la efectividad de los anticonvulsivantes.

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

El extracto de Ginkgo biloba podría potenciar el efecto de los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO's) y de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).

Los calcio-antagonistas (Nicardipina, Nifedipina) podrían ver disminuida su efectividad por el uso concomitante con Ginkgo biloba. La efectividad de los inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol) puede verse disminuida.

El uso simultáneo con Risperidona, Papaverina, Trazodona podría incrementar la ocurrencia de efectos adversos de estos.

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

### ¿CÓMO TOMAR TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE?

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Este medicamento se utiliza por vía oral. No tome los comprimidos estando en posición acostada. Los comprimidos deben ingerirse sin masticar con algo de líquido (preferiblemente con un vaso de agua). Se recomienda la toma de los comprimidos separada de las comidas.

**TEBOKAN** comprimidos recubiertos: Salvo otra prescripción facultativa, tome 120 mg al día (1 comprimido 3 veces al día), durante un periodo de tiempo de 6 a 8 semanas. En caso necesario la dosis puede aumentarse hasta 4 comprimidos al día (160 mg).

**TEBOKAN FORTE** comprimidos recubiertos: Salvo otra prescripción facultativa, tome 240 mg al día (1 comprimido 3 veces al día), durante un periodo de tiempo de 6 a 8 semanas.

**TEBOKAN** solución gotas: Salvo otra prescripción facultativa, Tómese 1 mL diluido en un poco de agua (todo extracto vegetal en forma de gotas tiende a enturbiarse después de algún tiempo, lo que no afecta la eficacia del mismo). Tres veces al día durante 6 a 8 semanas.

### SI OLVIDÓ TOMAR TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### SI USTED TOMA MÁS TEBOKAN Y TEBOKAN FORTE DEL QUE DEBIERA

No se han descrito casos de sobredosificación. Si usted ha tomado más **TEBOKAN** y **TEBOKAN FORTE** del que debiera, consulte con su médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica de referencia o acudir al centro de asistencia médica más cercano.

En caso de que se constate la sobredosis, el tratamiento debe ser sintomático.

### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

En personas con hipersensibilidad puede ocurrir shock alérgico o reacciones alérgicas de la piel (rojez, hinchazón, picor).

A las dosis recomendadas de Ginkgo biloba pueden aparecer trastornos gastrointestinales leves, dolores de cabeza, vértigo o agravación del vértigo y palpitaciones.

Si se observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte a su médico.

Con el uso crónico se pueden producir hematomas subdurales unilaterales o bilaterales.

### PRESENTACION

**TEBOKAN** comprimidos recubiertos: Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

**TEBOKAN FORTE**: Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

**TEBOKAN** solución gotas: Frasco conteniendo 25 mL.

**PRODUCTO DE USO DELICADO.  
ADMINÍSTRESE POR PRESCRIPCIÓN Y BAJO VIGILANCIA MÉDICA.  
PRODUCTO MEDICINAL. VENTA BAJO RECETA MÉDICA.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.  
PROTEGER DE LA LUZ.**

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Fabricado por:

**Laboratorios Rowe, S.R.L.**

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Atención al cliente: 809-687-2701, Ext. 105



**Rowe**®