



CARTYL® C

Glucosamina sulfato / Condroitin sulfato sódico
VIA ORAL
Polvo para solución oral

FORMULAS

Cada sobre monodosis de 5 g contiene:

Glucosamina sulfato.....	1500 mg
Condroitin sulfato sódico.....	1200 mg
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES

Tratamiento de la Osteoartritis.

DOSIFICACIÓN

Via Oral: Un sobre monodosis una vez al día.

PREPARACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

Disolver completamente, agitando, el contenido del sobre en un vaso de agua. Tomar todo el contenido del vaso. Se aconseja continuar el tratamiento durante 8 semanas o más.

CONTRAINDICACIONES

CARTYL C no han sido estudiado en niños, ni en mujeres embarazadas o en período de lactancia. En general, no se recomienda su uso en estos pacientes.

PRECAUCIONES

Se ha reportado adormecimiento con glucosamina + condroitin. En manejo de maquinaria que requiere estado de alerta mental, requiere precaución cuando se está administrando glucosamina + condroitin. El paciente debe determinar el efecto en su persona, antes de participar en estas actividades.

Los efectos adversos de glucosamina + condroitin involucran principalmente el tracto gastrointestinal, de tal manera que el tratamiento debe ser monitoreado en pacientes con enfermedades gastrointestinales.

CARTYL C debe ser tomado con precaución en pacientes con enfermedad cardíaca. Se ha reportado taquicardia en algunos pacientes, debido a su administración.

CARTYL C se excretan parcialmente por la orina. La glucosamina es metabolizada en el hígado. No existen estudios del uso de glucosamina + condroitin en pacientes con enfermedad hepática y renal, por lo que se recomienda no utilizarlo en dichos pacientes.

INTERACCIONES

No se han reportado interacciones medicamentosas con glucosamina + condroitin.

EFFECTOS ADVERSOS

La administración oral de **CARTYL C** ha sido bien tolerada. Debido a que la glucosamina involucra principalmente el tracto gastrointestinal, se han reportado casos de constipación, dispepsia, edema, pyrosis, náusea, palpitaciones y reacción en la piel debido al uso de glucosamina + condroitin.

SOBREDOSIFICACION

Ante cualquier eventualidad concurrir al centro toxicológico más cercano.

PRESENTACION

CARTYL C: Caja conteniendo 30 sobres monodosis.

PRODUCTO MEDICINAL.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.

Fabricado por:

Laboratorios Rowe, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Atención al cliente: 809-687-2701, Ext. 105



Rowe®