

BUTEN® COMPUESTO

Ambroxol clorhidrato / Clenbuterol clorhidrato

VIA ORAL

Solución

FORMULAS

Cada 100 mL contienen:

<i>Ambroxol clorhidrato</i>	150.0 mg
<i>Clenbuterol clorhidrato</i>	0.1 mg
Excipientes.....	C.S.

Cada 5 mL contienen:

<i>Ambroxol clorhidrato</i>	7.500 mg
<i>Clenbuterol clorhidrato</i>	0.005 mg
Excipientes.....	C.S.

CARACTERISTICAS

BUTEN COMPUESTO contiene dos sustancias que se complementan: El broncodilatador Clenbuterol y el mucocinético Ambroxol, los que dilatan las vías respiratorias y modifican las secreciones bronquiales facilitando su transporte. BUTEN COMPUESTO posee propiedades mucolíticas y secretolíticas, estimula por lo tanto el transporte de la secreción viscosa de las vías respiratorias y reduce el estancamiento de las mismas.

La combinación de estos dos fármacos, tiene por objeto obtener un efecto sinérgico en la terapéutica de los procesos patológicos de las vías respiratorias: En las enfermedades obstructivas, donde exista broncoespasmos y secreción bronquial alterada, obteniéndose una respuesta eficaz en la mayoría de los signos y síntomas de los enfermos con: Bronquitis espástica, bronquitis enfisematosa y asma bronquial.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

BUTEN COMPUESTO está indicado en bronquitis aguda, bronquitis asmático, asma bronquial y en general en todos aquellos procesos de las vías respiratorias que cursan con broncoespasmo y/o alteración de las características del moco normal.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, tirototoxicosis, arritmias cardíacas. No se ha demostrado seguridad en su uso durante el embarazo.

PRECAUCIONES

Este medicamento deberá administrarse con precaución en pacientes con úlcera gástrica y después de un reciente infarto al miocardio.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Ocasionalmente se presentan trastornos gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómito.

DOSIS

Mayores de 12 años y adultos: 4 cucharaditas 2 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: 3 cucharaditas 2 veces al día.

Niños de 2 a 4 años: 1-1/2 cucharadita 2 veces al día.

Niños de 8 meses a 2 años: 1 cucharadita 2 veces al día.

Lactantes hasta 8 meses: 1/2 cucharadita 2 veces al día.

PRESENTACION

BUTEN COMPUESTO: Frasco conteniendo 120 mL.

PRODUCTO MEDICINAL.

REQUIERE RECETA MEDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.

PROTEGER DE LA LUZ.

Fabricado por:

Laboratorios Rowe, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Ultima revisión de texto julio, 2012

Atención al cliente: 809-687-2701, Ext. 105

 **Rowe®**

03584-6
M/450901