

TUSILEXIL®

Carboximetilcisteína Dextrometorfano bromhidrato Clorfeniramina maleato

VIA ORAL

Jarabe / Gotas pediátricas

FORMULAS

Jarabe

Cada 100 mL contienen:

Carboximetilcisteína.....	3.00 g
Dextrometorfano bromhidrato.....	0.10 g
Clorfeniramina maleato.....	0.05 g
Excipientes.....	c.s.

Cada 5 mL contienen:

Carboximetilcisteína.....	150.0 mg
Dextrometorfano bromhidrato.....	5.0 mg
Clorfeniramina maleato.....	2.5 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada 2.5 mL contienen:

Carboximetilcisteína.....	75.00 mg
Dextrometorfano bromhidrato.....	2.50 mg
Clorfeniramina maleato.....	1.25 mg
Excipientes.....	c.s.

Gotas pediátricas

Cada mL contiene:

Carboximetilcisteína.....	50.0 mg
Dextrometorfano bromhidrato.....	4.0 mg
Clorfeniramina maleato.....	0.5 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCION TERAPEUTICA

TUSILEXIL es un compuesto que combina en su fórmula, la acción mucorreguladora y expectorante de la Carboximetilcisteína, la antitusiva del bromhidrato del Dextrometorfano y la antihistaminica descongestionante del maleato de Clorfeniramina, por lo que inhibe las más importantes y frecuentes manifestaciones de los procesos infecciosos del tracto respiratorio, restableciendo en forma rápida y segura el normal funcionamiento de las vías aéreas.

INDICACIONES

Tos irritativa aguda y crónica, tos en bronquitis, neumonía y bronconeumonía. Tos de los estados gripales, así como en los procesos inflamatorios alérgicos e infecciones de las vías respiratorias superiores.

REACCIONES ADVERSAS

Muy ocasionalmente puede producir sequedad de la boca, náuseas, mareos y somnolencias que ceden con la disminución de la dosis. En caso de función renal limitada, dosificar de acuerdo a la severidad de la misma.

PRECAUCIONES

No debe ingerirse simultáneamente con depresores del S.N.C. Ni con bebidas alcohólicas.
Si ocurre somnolencia no maneje automóviles, maquinarias peligrosas, ni tome bebidas alcohólicas.
Use con cuidado en niños, puede producir sueño o excitación.
Uso prolongado solo bajo vigilancia médica.

ADVERTENCIAS

No administrarlo en insuficiencia respiratoria (o cuando haya riesgo de ella). No administrarlo en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa, por el peligro de reacciones severas, eventualmente fatales.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, hipertrofia prostática, hipertensión arterial.
Pacientes con insuficiencia hepática o renal grave y en asmáticos. Tal como es habitual en este tipo de medicación debe ser administrado con prudencia en embarazadas y en casos de úlceras pépticas activas.

POSOLOGIA

Jarabe

Siempre que el médico no disponga lo contrario se puede seguir el siguiente esquema:

Adultos y niños mayores de 10 años:

2 cucharaditas de 5 mL cada 6 ó 8 horas.

Niños de 2 a 10 años:

1 cucharadita cada 6 ó 8 horas.

Niños menores de 2 años:

Según la indicación del médico.

Gotas

Lactantes hasta 6 meses:

0.3 mL 3 ó 4 veces al día.

Niños de 6 meses a 1 año:

De 0.3 mL a 0.6 mL 3 ó 4 veces al día.

Niños de 1 a 2 años:

De 0.6 mL a 1.2 mL 3 ó 4 veces al día.

ESTAS DOSIS PUEDEN SER MODIFICADAS DE ACUERDO AL CRITERIO MEDICO.

PRESENTACIONES

TUSILEXIL Jarabe: Frasco conteniendo 120 mL vía oral.

TUSILEXIL Gotas: Frasco conteniendo 25 mL vía oral, incluye jeringa dosificadora.

PRODUCTO MEDICINAL.

VENTA BAJO RECETA MEDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO, A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.

PROTEJASE DE LA LUZ.

Fabricado por:

Laboratorios Rowe, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Ultima revisión de texto enero, 2013

Atención al cliente: 809-687-2701, Ext. 105



Rowe®