TUSILEXIL® D

SIN AZUCAR

Carboximetilcisteína
Dextrometorfano bromhidrato
Clorfeniramina maleato

VIA ORAL

Jarabe

FORMULAS

Cada 100 mL contienen:
Carboximetilcisteína.....3750 mg
Dextrometorfano Bromhidrato.....200 mg
Clorfeniramina maleato.....50 mg
Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL contienen:
Carboximetilcisteína.....187.5 mg
Dextrometorfano bromhidrato.....10.0 mg
Clorfeniramina maleato.....2.5 mg
Excipientes.....c.s.

ACCION TERAPEUTICA

La carboximetilcisteína tiene acción mucolítica rompiendo los enlaces disulfuro de las mucoproteínas de las secreciones disminuyendo de esta forma su viscosidad. El Dextrometorfano es un antitusivo de acción central, utilizado para el alivio de la tos improductiva que ejerce su efecto en el centro de la tos. La Clorfeniramina es un antihistamínico competitivo por los receptores H1, además produce un grado moderado de sedación, pues, incide en los receptores histamínicos del sistema nervioso central.

INDICACIONES

Tos irritativa aguda y crónica, tos en bronquitis, neumonía y bronconeumonía. Tos de los estados gripales, así como en los procesos inflamatorios, alérgicos e infecciones de las vías respiratorias superiores.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Siempre que el médico no disponga lo contrario, se puede seguir el siguiente esquema:
Adultos: 15 mL cada 8 horas.
Niños de 6 a 12 años: 10 mL cada 12 horas.
Niños de 2 a 5 años: 5 mL cada 12 horas.
Estas dosis pueden ser modificadas de acuerdo al criterio médico.
TUSILEXIL D cuenta con un vasito dosificador el cual está graduado desde 2.5 hasta 15 mL para una dosificación exacta.

REACCIONES ADVERSAS

Muy ocasionalmente puede producir sequedad de boca, náuseas, mareos, somnolencia y descoordinación que ceden con la disminución de la dosis. En caso de función renal limitada, dosificar de acuerdo a la severidad de la misma.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, hipertrofia prostática, hipertensión arterial. Pacientes con insuficiencia hepática o renal graves y en asmáticos. Pacientes embarazadas o lactando y en casos de úlcera péptica activa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No administrarlo en insuficiencia respiratoria (o cuando haya riesgo de ella). No administrarlo en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), por peligro de reacciones severas, eventualmente fatales.

No debe ingerirse simultáneamente con depresores del SNC, ni con bebidas alcohólicas.

INCOMPATIBILIDAD E INTERACCIONES PRINCIPALES

Se han descrito reacciones graves e incluso mortales a consecuencia de la administración de Dextrometorfano en pacientes tratados con IMAO. La vía de metabolización del Dextrometorfano es la isoenzima CYP2D6 del citocromo P4540, por lo que hay que tener en cuenta la posibilidad de interacciones con inhibidores de esta enzima como la Amiodarona, Fluoxetina, Haloperidol, Paroxetina, Propafenona, Quinidina y Tioridacina.

Los antihistamínicos pueden potenciar los efectos sedantes de los depresores del SNC como el alcohol, los barbitúricos, los hipnóticos, los analgésicos opiáceos, los sedantes ansiolíticos y los antipsicóticos.

SOBREDOSIFICACION

No se han presentado casos de sobredosificación, En caso de intoxicación diríjase al centro de asistencia médica más cercano.

PRESENTACION

TUSILEXIL D: Caja conteniendo frasco de 120 mL.

PRODUCTO MEDICINAL.
VENTA BAJO RECETA MEDICA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.
PROTEGER DE LA LUZ.

Fabricado por:
Laboratorios Rowe, S.R.L.
Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Reg. Ind. 17090.
Ultima revisión de texto julio, 2012
Atención al cliente: 809-687-2701, Ext. 105

Rowe®

03957