

DICLO[®]-K BIOTIC

Diclofenaco potásico / Amoxicilina

VIA ORAL

Comprimidos recubiertos

FORMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenaco potásico.....	50 mg
Amoxicilina trihidrato.....	500 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCION TERAPEUTICA

Antibiótico bactericida de amplio espectro.
 Analgésico.
 Antiinflamatorio.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

1 comprimido cada 8 horas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los derivados penicilínicos y/o al Diclofenaco.

Embarazo y lactancia.

Úlcera gastroduodenal.

Insuficiencia hepática y/o renal severa.

Niños menores de 15 años.

Mononucleosis infecciosa.

No asociar con Allopurinol.

No administrar a pacientes en quienes la administración de Acido Acetilsalicílico u otras drogas que inhiban la síntesis de prostaglandinas favorezca la aparición de crisis de asma, urticaria o rinitis alérgica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se observará máxima precaución en pacientes con antecedentes gastrointestinales, lesiones hepáticas y/o renales, trastornos de la coagulación. En tratamientos prolongados es conveniente realizar periódicamente controles hemáticos, de la función hepática y renal. Supervisión estricta de la diuresis y función renal al inicio del tratamiento en pacientes ateroscleróticos, cardíacos, con síndrome nefrótico o que tomen diuréticos.

REACCIONES ADVERSAS Y COLATERALES

DICLO-K BIOTIC es generalmente bien tolerado. Ocasionalmente pueden observarse trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarreas, epigastalgia), manifestaciones alérgicas, (urticaria, eosinofilia, edema de Quincke). Cefaleas. Insomnio. Elevación de transaminasas hepáticas. Trastornos hemáticos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Asociaciones desaconsejadas: otros antiinflamatorios.

Anticoagulantes orales, Heparina y Ticlopidina. Litio. Metrotrexate.

Allopurinol (ver contraindicaciones).

Asociaciones a tener en cuenta y que necesitan precaución de empleo: Antihipertensivos, diuréticos.

PRESENTACION

DICLO-K BIOTIC: Caja conteniendo 50 comprimidos recubiertos.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

NO DEJE ESTE NI NINGUN OTRO MEDICAMENTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**PRODUCTO MEDICINAL.****REQUIERE RECETA MEDICA.****MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.****MANTENER A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.****PROTEJASE DE LA LUZ.**

Elaborado por:

Laboratorios Rowe, C. por A.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090.

Última revisión de texto agosto, 2008

Atención al cliente: 809-687-5155, Ext. 231