

PROLUX®

Citicolina

Vía oral

Tabletas - Solución gotas

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico,

FÓRMULA

PROLUX 500 tabletas:

Cada Tableta contiene:

Citicolina 500mg
Excipientes c.s.p. 1 Tableta

PROLUX Solución gotas:

Cada ml de solución contiene:

Citicolina 100mg
Excipientes c.s.p. 1ml.

PROPIEDADES:

PROLUX es un fármaco que contiene como principio activo básico Citidin difosfato de colina, Citicolina, Actúa incrementando los síntesis de fosfolípidos colínicos estructurales de la membrana celular, especialmente en las neuronas, modulando la función de la bomba de intercambio iónico y los receptores, logrando una correcta neurotransmisión, Aumenta la presión de oxígeno cerebral y también el aprovechamiento del oxígeno por la neurona, Aumenta el poder energético y el ATP de la neurona, La citicolina ha mostrado inducir un aumento de la sensibilidad de los receptores a la dopamina, por lo que mejora la respuesta a la levodopa en pacientes con la enfermedad de Parkinson.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Reconstituyente cerebral

Neuro activador Metabólico,

Tratamiento de las secuelas de accidente cerebrovasculares involución,

INDICACIONES:

- Insuficiencia cerebrovascular crónica y sus manifestaciones neurológicas como vértigos, cefaleas, insomnio, déficit de memoria, de atención y concentración,
- Secuelas de accidentes cerebrovasculares como: déficit motor; hipertonia espásticas, etc.,
- Manifestaciones neuropsíquicas de la involución senil como falta de interés, trastornos cognitivos, reducción de la memoria y la atención,
- Arterioesclerosis Cerebral,
- Lesiones cerebrales de origen traumático con o sin pérdida de la conciencia,

EFFECTOS ADVERSOS:

Dado que la Citicolina, es perfectamente bien tolerada no da lugar a efectos secundarios, Solo en muy pocos casos se han observado ligeros trastornos gastrointestinales,

CONTRAINDICACIONES:

Solamente está contraindicado en pacientes con hipertonia del parasimpático, Hipersensibilidad a la citicolina, lactancia y embarazo,

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Citicolina por vía oral puede provocar asma, sobre todo en pacientes alérgicos al Ácido Acetil Salicílico,

La solución oral entre sus excipientes contiene propil y metilparabenos, que pueden provocar reacciones alérgicas, posiblemente retardadas. También contiene sorbitol, por lo que los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento,

INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA:

PROLUX no interactúa con los vasodilatadores cerebrales de tal manera que pueda asociarse a estos terapéuticamente,

La citicolina potencia los efectos de la levodopa,

No debe administrarse simultáneamente con medicamentos que contenga metilfenoxato,

INTOXICACIÓN:

Dada la escasa toxicidad de la citicolina no se prevee intoxicación alguna con este medicamento. En caso de ingestión accidental, diríjase al centro médico más cercano. Se recomienda utilizar una terapia sintomática,

POSOLÓGIA:

Tabletas, 1 a 4 tabletas por día,

Solución gotas de 100 a 200 mg (1-2 ml),

PRESENTACIÓN:

PROLUX 500 tabletas: Caja conteniendo 10 tabletas,

PROLUX Solución gotas: Caja conteniendo frasco por 10 mL + gotero,

PRODUCTO MEDICINAL. VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.

Fabricado por: CAMILO Labs, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana,

Reg. Ind. 16169

Para: Laboratorios Rowe, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana,

Reg. Ind. 17090

