



# CLOMAK®

Clotrimazol  
Vía Vaginal / Tópica  
Crema / Ovulos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

## FORMULAS

### CLOMAK CREMA TÓPICA/VAGINAL

Cada 100 g contienen:

Clotrimazol.....1g  
Excipientes.....c.s.

Cada 5 g de crema contienen:

Clotrimazol.....0,5 mg  
Excipientes.....c.s.

### CLOMAK 200

Cada óvulo contiene:

Clotrimazol.....200 mg  
Excipientes.....c.s.

### CLOMAK 500

Cada óvulo contiene:

Clotrimazol.....500 mg  
Excipientes.....c.s.

## INDICACIONES

**CLOMAK**, cuyo principio activo es el Clotrimazol se caracteriza por ser un agente antimicótico (que se utiliza contra las infecciones causadas por hongos) de amplio espectro con efecto fungicida, fungistático y contra algunas bacterias gram positivas, negativas y anaerobias, sensibles al Clotrimazol.

**CLOMAK** óvulos/crema vaginal, están indicados para el tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta (vaginitis, vulvovaginitis), causadas por especies de *Candida* o tricomoniasis.

**CLOMAK** crema vaginal también puede utilizarse en tratamiento de balanitis de origen candidiásico y como tratamiento complementario del cónyuge de mujeres infectadas.

**CLOMAK** crema tópica, está indicada en las dermatomicosis, causadas por dermatofitos, levaduras, mohos y otros hongos, pitiriasis versicolor y eritrasma.

## NO USE ESTE MEDICAMENTO:

- Si tiene antecedentes de hipersensibilidad (alergia) al Clotrimazol o a los imidazoles en general.

## TENGA PRECAUCIÓN:

- No es aconsejable realizar el tratamiento vaginal durante la menstruación.

- Evite usar duchas vaginales o tampones mientras dura el tratamiento con **CLOMAK**.

- Los óvulos vaginales pueden reducir la protección proporcionada por preservativos y diafragmas (productos que contienen latex).

Este efecto es temporal y solo ocurre durante el tratamiento.

- Debe evitarse el contacto de la crema vaginal con los ojos.

- Utilice ropa interior de algodón fresca, mientras usa este medicamento. Se recomienda usar una toalla higiénica a fin de proteger la ropa interior.

- No suspenda el uso de este medicamento a menos que su médico se lo indique. Si suspende el tratamiento antes de finalizado, su infección puede retornar.

## USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Debido al potencial riesgo de toxicidad seria incluyendo vasoespasmos, que puede ocurrir con concentraciones incrementadas en plasma de derivados del ergot, el uso concurrente de Clotrimazol y derivados del ergot está contraindicado.

El Clotrimazol puede causar disminución del adaramiento del Fentanyl, con el subsecuente efecto opioide incrementado. La co-administración de Clotrimazol con Tacrolimus ha resultado en un incremento de los niveles sanguíneos del Tacrolimus. Si ambos son utilizados concurrentemente, debe monitorizarse los niveles de Tacrolimus y realizar ajuste de dosis como sea apropiado.

## Embarazo:

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento:

Durante los 3 primeros meses de embarazo se evaluará el beneficio de la utilización del preparado antes de ser administrado.

Se considera al Clotrimazol como un fármaco seguro para su uso en las infecciones cutáneas y vaginales, durante el embarazo. Es práctico para sanear el canal del parto durante las 4 a 6 últimas semanas del embarazo.

**Lactancia:** No existen reportes disponibles que describan el uso de Clotrimazol durante la lactancia, y el efecto de la exposición del fármaco en la leche en los lactantes es desconocido. No es sabido si el Clotrimazol afecta la cantidad y la composición de la leche materna, por lo que hasta que existan más datos disponibles, tenga precaución cuando se considere el uso de Clotrimazol en mujeres durante la lactancia.

## CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir vehículos o maquinaria.

## CÓMO USAR CLOMAK

### CLOMAK óvulos:

**CLOMAK 200:** Durante tres días seguidos se introduce un óvulo de 200 mg al día, lo más profundo posible en la vagina antes de acostarse.

Si es necesario puede repetirse el tratamiento una semana después.

**CLOMAK 500:** Aplique el óvulo vaginal preferiblemente por la noche introduciéndolo profundamente en la cavidad vaginal como dosis única.

**CLOMAK crema tópica:** Aplicar una capa fina 2-3 veces al día.

**CLOMAK crema vaginal:** Durante 6 días seguidos se introduce en la vagina el contenido de un aplicador vaginal una vez al día después de acostarse. Además se aplica una pequeña cantidad de la crema en la región vulvo anal. El tratamiento puede continuarse hasta completar 14 días.

Para evitar la reinfección deberá tratarse el hombre localmente con crema aun en ausencia de síntomas.

Si los síntomas persisten, consultar al médico.

## INDICACIONES DEL USO PARA EL APLICADOR

1- Destape y conecte el aplicador enroscándolo al tubo.

2- Tire el émbolo hacia atrás hasta el final del aplicador; llene el aplicador apretando el tubo hasta que la crema llegue al final del émbolo.

3- Retire el tubo e inserte el extremo abierto del aplicador dentro de la vagina hasta donde pueda deslizarse cómodamente.

4- Empuje el émbolo suavemente hasta el fondo, hasta que

el aplicador esté vacío.  
5- Retire el aplicador junto con el émbolo y descártelo.

#### **SI OLVIDÓ USAR CLOMAK**

Use la dosis olvidada tan pronto como sea posible, a menos que se encuentre muy cerca de la hora de su próxima dosis.

Salte la dosis olvidada si se encuentra muy cerca de su próxima dosis regular.

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico.

#### **SI USA MÁS CLOMAK DEL QUE DEBIERA**

En caso de sospecha de sobredosificación, consulte de inmediato al centro médico más cercano.

Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación es poco probable la intoxicación, ni en el caso de ingestión accidental.

Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento e instaurarse la terapia adecuada.

#### **POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, Clotrimazol puede producir efectos no deseados. Esto no significa que suceda en todas las personas.

En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como por ejemplo irritación, sensación de quemazón y picor, que no suelen determinar la suspensión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo.

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

#### **PRESENTACIONES DE CLOMAK**

##### **CLOMAK crema tópica:**

Caja que contiene tubo con 20 g de crema.

##### **CLOMAK crema vaginal:**

Caja que contiene tubo por 20g o 50g y aplicadores.

**CLOMAK 200:** Caja que contine 3 óvulos.

**CLOMAK 500:** Caja que contine 1 óvulo.

No utilice **CLOMAK** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase, o si observa indicios visibles de deterioro.

**PRODUCTO MEDICINAL.  
VENTA BAJO RECETA MEDICA.  
MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
CONSERVAR A TEMPERATURA  
NO MAYOR DE 30°C.**

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o escríbanos a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Fabricante y Titular: **Laboratorios Rowe, S.R.L.**  
Santo Domingo, República Dominicana. Reg. Ind.: 17090  
Línea de atención al usuario: 1-809-200-1282.