

DERMISCRUB®

Gluconato de Clorhexidina

Vía tópica

Jabón Líquido

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dársele a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA

Cada 100 mL contienen:

Gluconato de Clorhexidina 20,2 mL
Excipientes, c.s.p. 100 mL

DESCRIPCIÓN:

DERMISCRUB es un antiséptico muy eficaz para uso tópico con acción bactericida residual contra gérmenes grampositivos y gramnegativos, virus y hongos.

El efecto antimicrobiano del DERMISCRUB es causado por destrucción de la membrana de la célula microbiana.

INDICACIONES:

Esta indicado para realizar una efectiva limpieza y antisepsia de la piel (Heridas, quemaduras, úlceras, foliulitis, forúnculo, impétigo contagioso, fistulas, escaras, etc.), asepsia y antisepsia del personal médico y paramédico, antisepsia pre-quirúrgica y post quirúrgica de la piel en pacientes para cirugía; lavado y antisepsia de heridas traumáticas y quirúrgicas; higiene o baño de pacientes inmunosuprimidos; profilaxis general de la piel.

CONTRAINDICACIONES:

El gluconato de clorhexidina puede causar dermatitis por contacto o irritación de la piel, incluso en quemados. Pacientes que han mostrado hipersensibilidad a la clorhexidina.

REACCIONES ADVERSAS:

Clorhexidina no es tóxica, aún usada en recién nacidos, porque su absorción cutánea es mínima. Reacciones locales leves como dermatitis de contacto o urticaria, pueden presentarse en forma ocasional. Más raramente se ha reportado anafilaxia, edema facial y síntomas respiratorios como broncoespasmo, disnea o congestión nasal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La gluconato de clorhexidina es incompatible con jabones y otros materiales aniónicos que tengan surfactantes aniónicos, como lauril sulfato sódico, Trisilicato de magnesio, bentonita, carmelosa, polietileno o polihidroxietilmetacrilato. Posible reducción de la actividad del clorbutanol, por fenómeno de adsorción.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

DOSIS:

Limpieza y antisepsia de la piel: Aplicar aproximadamente 5mL de DERMISCRUB en la zona afectada y frotar suavemente. Dejar actuar por 3 minutos. Enjuagar con abundante agua.

Lavado antiséptico de manos: Humedecer las manos y antebrazos, aplicar 5 mL de DERMISCRUB y lavar por 1 minuto. Enjuagar y secar.

Lavado quirúrgico pre-operatorio de las manos: Aplicar aproximadamente 5mL de DERMISCRUB en las palmas, frotar por 5 minutos vigorosamente en antebrazos y manos con especial atención en uñas y espacios interdigitales. Enjuagar.

Repetir el proceso por segunda vez.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL Y TRATAMIENTO:

Frente a una ingestión accidental, clorhexidina es pobremente absorbida.

Un lavado gástrico con solución salina, leche o gelatina puede ser suficiente. Emplee medidas de soporte general según sea necesario.

ADVERTENCIAS:

- Sólo para USO EXTERNO.
- Evitar el contacto con los ojos y el oído medio.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo frasco dispensador de 120 mL • Galón conteniendo 3785,41 mL • Sachet conteniendo 8 mL

PRODUCTO MEDICINAL. VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.

Fabricado por: CAMILO Labs, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 16169

Para: Laboratorios Rowe, S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Reg. Ind. 17090

