

TECASSOL®

Centella Asiática
Polvo - Ungüento Vía tópica

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA

TECASSOL POLVO

Cada 5 g contienen:

Centella asiática; (extracto seco reconstituido al 40% de asiaticósido y 60% de ácidos madecásico y asiático)	0,10 g
Excipientes, c.s.p.	5 g

TECASSOL 1% UNGÜENTO

Cada 20 gramos contienen:

Extracto Titulado de Centella Asiática	0,20 g
Excipientes c.s.p.	20,00 g

PROPIEDADES:

TECASSOL contiene como principio activo base, el Extracto Titulado de Centella Asiática el cual se caracteriza porque posee una acción de estimulación sobre la biosíntesis del colágeno mediante la regulación de la proliferación de los fibroplastos aumentando la producción de tejido conjuntivo a nivel de la piel y de las paredes vasculares.

INDICACIONES:

TECASSOL polvo está indicado como regenerador tisular y estimulante de la cicatrización en quemaduras; independientemente de la gravedad y extensión de la lesión. **TECASSOL** favorece la epitelización y disminuye la presencia y gravedad de deformaciones queloides y cicatrices fibrosas retráctiles.

HERIDAS TRAUMÁTICAS Y QUIRÚRGICAS:

Cuando la solución de continuidad conlleva pérdida de sustancia, **TECASSOL** estimula y activa la reparación tisular y facilita la formación de cicatrices flexibles y de buena troficidad.

Injertos Cutáneos:

TECASSOL favorece su anclaje y permite que los injertos delgados preñan sobre el tejido de granulación.

Úlceraciones Tórpidas y Escaras:

En las úlceras banales varicosas o con flebitis segmentarias escaras por decúbito con retraso de cicatrización, con el uso de **TECASSOL** se logra un estímulo vital del tejido de granulación con resultados favorables.

Radioepitelitis:

Lesión dérmica frecuente por el uso obligado de radioterapia. En estos casos **TECASSOL** da excelentes resultados como preventivo y curativo. Su empleo permite que las lesiones se limpien más fácilmente.

Ginecología-Obstetricia:

TECASSOL acorta los retrasos de cicatrización y asegura el buen mantenimiento de las suturas en los casos de cirugía ginecológica. llagas obstétricas, episiotomías. También se usan en las grietas del pezón durante el periodo de lactancia.

Fibrosis Diversas:

TECASSOL ha demostrado su eficacia en la profilaxis y tratamiento de degeneraciones queloides y de cicatrices fibrosas retráctiles producidas por heridas y quemaduras causantes de deformaciones y limitaciones articulares y funcionales. En todos estos casos se puede combinar la terapia tópica con la terapia oral para obtener una más eficiente y rápida respuesta terapéutica.

TECASSOL está indicado además en diversas pequeñas lesiones de la vida cotidiana como son: cortaduras pequeñas, quemaduras, fisuras labiales o plantares, etc.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede en alguno que otro caso ocurrir reacciones cutáneas de sensibilización (prurito, sensación de quemaduras, eczema, etc.)

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La fenilbutazona y la dexametasona interfieren en la velocidad de reparación inducida por asiaticósido en heridas experimentales en ratas, siendo más pronunciada la interferencia dada por fenilbutazona ya que esta droga normalmente disminuye la capacidad de reparación tisular orgánica. Al parecer el sitio de interacción estaría a nivel de las membranas lisosomales, ya que es sabido que las drogas antiinflamatorias actúan estabilizando las mismas impidiendo la liberación de las enzimas correspondientes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Las presentaciones tópicas no están indicadas para uso oftálmico.
Aplicar el polvo solo en la zona afectada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

TECASSOL polvo/crema: Tópica.

POSOLOGÍA:

TECASSOL polvo/crema: Una limpieza o desinfección a fondo debe preceder a la aplicación tópica del polvo/crema, **TECASSOL** polvo/crema es de uso más fácil y aporta mayor poder secante en las heridas supurantes anfractuosas y dolorosas. Aplicar cantidad suficiente para cubrir la lesión de 1 a 3 veces al día. La duración del tratamiento se podrá determinar según la respuesta del paciente respecto a la lesión.

SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: prurito, eczema, quemazón. En caso de que aparezcan estos síntomas debe lavar la región con abundante agua.

Si persisten, debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha aplicado.

PRESENTACIÓN:

TECASSOL 1% crema: Caja conteniendo tubo de 20 gramos.

TECASSOL Polvo: Caja conteniendo un frasco espolvoreador con 5 g.

**PRODUCTO MEDICINAL. VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.**

Fabricado por: **CAMILO Labs, S.R.L.**
Santo Domingo, Rep. Dominicana,
Reg. Ind. 16169
Para: **Laboratorios Rowe, S.R.L.**
Santo Domingo, Rep. Dominicana,
Reg. Ind. 17090

