

TECASSOL-NH®

Centella Asiática - Neomicina - Hidrocortisona Vía tópica Crema

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dársele a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA

TECASSOL-NH

Cada 100g de crema contiene:

Extracto Titulado de Centella Asiática	1,000 g
Sulfato de Neomicina (equiv. a 350.000 U.I. de Neomicina Base)	0,600 g
Hidrocortisona Acetato	1,000 g
Excipientes c.s.p.	100 g

PROPIEDADES:

TECASSOL-NH crema tópica, contiene como principio activo Extracto Titulado de Centella Asiática, el cual se caracteriza porque posee una acción de estimulación sobre la biosíntesis del colágeno mediante la regulación de la proliferación de los fibroblastos aumentando la producción de tejido conjuntivo a nivel de la piel y de las paredes vasculares. La Neomicina, como sal sulfato, es un antibiótico bactericida de la familia de los aminoglucósidos. Actúa sobre organismos Gramnegativos y Grampositivos, al inhibir la síntesis proteica, por unión con el ARN ribosomal causando con ello una perturbación en el código genético bacteriano. Es particularmente activa contra microorganismos tales como: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemofilius influenzae, Klebsiella, Enterobacter. La Hidrocortisona es un esteroide con acción antiinflamatoria, antialérgica y antipruriginosa, que tiene como característica su actividad glucocorticoide con un mínimo de reacciones adversas.

INDICACIONES:

La asociación para uso tópico de **TECASSOL-NH** con Neomicina e Hidrocortisona en crema, permite tratar la dermatitis infecciosas, heridas quemaduras sobreinfectadas con reacción inflamatoria. También en fisura anal.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Reacciones de hipersensibilidad, tales como prurito, sensación de quemadura y erupciones eccematiformes en la piel. Estos efectos se presentan cuando se usa este medicamento sobre áreas extensas sobre la piel y por uso prolongado. Las lesiones de eccema pueden diseminarse a distancia de zonas. Por la neomicina, la alergia puede ser cruzada con otros antibióticos de la familia de los aminoglucósidos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Si usted está utilizando algún otro preparado tópico que contenga antibióticos como gentamicina, consulte a su médico o farmacéutico antes de aplicar este medicamento.

PRECAUCIONES:

No está indicado para uso oftálmico. No utilizar en grandes superficies, bajo oclusión o en capas espesas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica

POSOLOGÍA:

Limpia la herida antes de la aplicación.

En todos los casos señalados aplicar este medicamento 2 veces al día sobre el área afectada.

TECASSOL NH Crema se utiliza durante los primeros 8 días de tratamiento y luego se continúa con Tecassol Polvo ó Crema.

SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

Si usted sigue atentamente las instrucciones de uso de este medicamento, la probabilidad de una sobredosis es muy rara. Si se aplica sobre áreas extensas de la piel o si se aplica con vendajes, existe una posibilidad mayor de absorción y aparición de efectos adversos. Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos. Es ese caso debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente.

PRESENTACIÓN:

TECASSOL N-H. Crema: Caja conteniendo tubo de 10 g.

**PRODUCTO MEDICINAL. VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C.**

Fabricado por: **CAMILO Labs, S.R.L.**
Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Reg. Ind. 16169
Para: **Laboratorios Rowe, S.R.L.**
Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Reg. Ind. 17090

